

# Dipirona 1g



**SOLUCIÓN INYECTABLE IM. / IV.**

**SINTESIS**

**Cada Ampolla contiene:**

Dipirona Sódica .....1g  
Vehículo c.s.p. ....2 ml

**Características generales:**

La Dipirona es un analgésico, antipirético, antiespasmódico, antiinflamatorio, derivado de las pirazonas cuyo mecanismo de acción es la inhibición de la biosíntesis de las prostaglandinas, que alivia el dolor elevando el umbral del dolor sin alterar la conciencia ni otras modalidades sensitivas y reducen la temperatura del organismo.

**Indicaciones:**

Estados dolorosos y febriles, dolor de cabeza, dentales, dolores musculares, alivio del malestar de gripe, resfriado, reumatismo y lumbago. Dolores traumáticos o postoperatorios. Dolores postparto. Artritis reumatoidea, osteoartritis, espondilitis, fibrositis.

**Contraindicaciones:**

Hipersensibilidad a algunos de los componentes de la fórmula y a derivados pirazonónicos. Está contraindicado en gastritis, úlcera péptica o gastroduodenal activa, daño hepático o renal, en presencia de edema, insuficiencia cardíaca.

**Efectos adversos:**

**Reacciones hematológicas:** La aparición de fiebre o ulceraciones bucales, puede ser indicio de agranulocitosis, en este caso se recomienda el cese del tratamiento y realizar un hemograma, si se confirma, el paciente debe ser hospitalizado. A veces la alteración de los leucocitos, especialmente en persona con hipersensibilidad es independiente de la dosis y duración del tratamiento. Otros efectos indeseables pueden ser anemia hemolítica, anemia aplásica, leucopenia, trombocitopenia, reacción anafiláctica, disnea, náusea, vómitos y otras reacciones alérgicas.

**Advertencias y Precauciones:**

No debe usarse el tratamiento por más de 7 días, sin el consejo del médico, ni exceder la dosis recomendada, ni en pacientes con antecedentes de alteraciones hematológicas. Administrar con precaución a personas con antecedentes de enfermedades del hígado y riñón o discrasia sanguínea. En mujeres embarazadas o que amamantan, administrar solo por indicación médica. En las terapias prolongadas, deben vigilarse los riesgos hematológicos, realizar los exámenes por lo menos cada 15 días, debiendo suspenderse el medicamento al primer indicio de alteración leucocitaria.

**Interacciones medicamentosas:**

El uso asociado a fenotiazinas o barbitúricos, especialmente la clorpromazina, puede dar lugar a hipotermia grave. La ciclosporina no se recomienda su uso simultáneo con la Dipirona, porque esta puede reducir el nivel de la ciclosporina. El uso combinado del anticoagulante warfarina y fenilbutazona está contraindicado, salvo bajo supervisión extremadamente cuidadosa.

**Manifestaciones y manejo de la sobredosificación:**

En caso de sobredosis aguda se ha reportado náuseas, vómitos, dolor abdominal, alteración de la función renal. Después de dosis muy altas, la excreción del metabolito puede causar coloración roja de la orina. El principal metabolito puede ser eliminado mediante hemodiálisis, hemofiltración, hemoperfusión o filtración plasmática.

**Posología:**

1 ampolla intramuscular profunda, tres veces al día o según criterio médico. Si requiere una acción más rápida existe la vía intravenosa de 1 a 2g (una ampolla de 2 ml) cada 8 horas, según la necesidad.

**Presentación:**

Caja conteniendo 3 y 100 Ampollas de 2 ml

**Conservación:**

Almacénese a temperatura entre 15 y 30°C.



Elaborado en la República Dominicana por:  
**Laboratorios Sintesis, S.R.L**  
Manos que inyectan **VIDA**