

Visfloxin

Ciprofloxacina 0.3%

Solución Oftálmica



Síntesis

COMPOSICIÓN

Cada mL contiene:

Ciprofloxacina Clorhidrato 3 mg

Agua Destilada Estéril c.s.p..... 1 mL

ACCIÓN FARMACOLÓGICA.

Antibacteriano con acción bactericida, del grupo de las fluoroquinolonas. Actúa inhibiendo el enzima bacteriano ADN-girasa, con lo que bloquea el proceso de replicación del ADN bacteriano.

INDICACIONES.

Visfloxin solución oftálmica está indicado en el tratamiento de infecciones oculares causadas por microorganismos grampositivos tales como pseudomonas aeruginosas, stafilococcus aureus, estreptococos, haemofilus influenzae, úlceras corneales, conjuntivitis. Indicado también en profilaxis prequirúrgica y posquirúrgica.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula y/o antecedentes de hipersensibilidad a otras quinolonas.

EFECTOS ADVERSOS.

Puede ocasionar irritación, quemadura, sensación de cuerpo extraño, prurito, hiperemia conjuntival, resequedad, lagrimeo y mal sabor de boca después de la instilación. Congestión e inflamación ocular.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

El uso prolongado de ciprofloxacina solución oftálmica puede motivar el crecimiento excesivo de organismos no susceptibles y en algunos pacientes con úlcera corneal se ha observado la presencia de precipitados cristalinos en la córnea, que desaparecen al disminuir o concluir el tratamiento. Rara vez se han presentado reacciones de hipersensibilidad y alergia, si esto ocurre suspender el tratamiento inmediatamente. Madres lactantes: En este caso administrar con cuidado si la aplicación es tópica, debido a que puede ser excretada en la leche materna. Para seguridad no se recomienda en niños menores de 12 años. Usar durante el embarazo solo si el beneficio justifica el riesgo potencial del feto.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

Hasta el momento se desconoce interacciones específicas con la ciprofloxacina solución oftálmica debido a la baja concentración sistémica de la ciprofloxacina tras la administración ocular tópica.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:

La sobredosis tópica de Visfloxin solución oftálmica puede ser retirada de uno o ambos ojos con agua tibia corriente.

POSOLÓGIA.

Vía de administración: Oftálmica

Úlcera corneal: Adultos y niños mayores de 12 años - Instilar 2 gotas de la solución en el ojo afectado cada 15 minutos, en las primeras 6 horas, luego 2 gotas en el ojo cada 30 minutos por el resto del día.

En el segundo día instile 2 gotas en el ojo afectado cada hora, de los 3 a los 14 días instilar 2 gotas en el ojo cada cuatro horas.

Conjuntivitis: Adultos y niños mayores de 1 año – Instilar una o dos gotas en el saco conjuntival cada dos horas por dos días luego dos gotas cada cuatro horas por cinco días. El tratamiento se puede prolongar más de 14 días si la reepitelización corneal no se ha completado.

PRESENTACIÓN:

Caja con Frasco gotero con 5 mL

CONSERVACIÓN:

A temperatura entre 15 y 30°C.



Elaborado en República Dominicana por:

Laboratorios Síntesis, S.R.L

Manos que inyectan **VIDA**