

Dolo-Neurotropas

Síntesis

SOLUCIÓN INYECTABLE INTRAMUSCULAR

Composición:

Cada ampolla I de 2 ml contiene:

Diclofenac Sódico.....	75 mg
Vehículo c.s.p.....	2 ml

Cada ampolla II de 1 ml Contiene:

Vitamina B-1 (Tiamina Clorhidrato).....	100 mg
Vitamina B-6 (Piridoxina Clorhidrato).....	100 mg
Vitamina B-12 (Cianocobalamina).....	5 000 mcg
Lidocaína Clorhidrato.....	1 mg
Vehículo c.s.p.	1 ml

Acción farmacológica:

Las vitaminas son indispensables para el mantenimiento de los procesos vitales en el organismo. La falta de vitamina o un suministro vitamínico insuficiente conducen a síntomas carenciales. En vista de que las vitaminas del complejo B están muy relacionadas con el metabolismo del sistema nervioso, el suministro de vitaminas neurotropas está indicado en muchos síntomas carenciales de vitamina B relacionados con trastornos del sistema nervioso. También puede utilizarse en el beriberi alcohólico, encefalopatías de Wernick, neuralgias y neuropatías periféricas, ciática, parálisis facial, neuralgias herpéticas.

El diclofenac es un antiinflamatorio que posee actividades analgésicas y antipiréticas, indicado en enfermedades reumáticas agudas y dolores intensos.

Indicaciones:

Dolo-Neurotropas Síntesis, está indicado en las neuralgias, síndrome de irritación de las raíces nerviosas, neuralgias intercostales, síndrome hombro-brazo, de las vértebras cervical y lumbar, ciática, herpes zóster, estados de agotamiento nervioso, hiperemesis, mielosis funiculares, neuritis coadyuvante en esclerosis múltiple. En todos los casos de reumatismo en sus formas tanto inflamatorias como degenerativas por activación inflamatoria.

Contraindicaciones:

En los casos de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. Úlcera gástrica y duodenal, trastornos de la función hepática y hematopoyética, porfiria, niños menores de 6 años de edad. Embarazo y lactancia.

Reacciones adversas:

Pueden presentarse molestias gastrointestinales, pérdida de sangre gastrointestinal, en ciertas circunstancias con hemorragia y perforación. Reacciones alérgicas, ataques de asma con o sin disminución de la tensión sanguínea. Trastornos nerviosos centrales, edema, sobre todo en caso de hipertensión.

Advertencias / Precauciones:

La vitamina B6 en dosificación elevada puede debilitar la acción de la L-Dopa en la enfermedad de Parkinson o en el parkinsonismo sintomático. En pacientes con disposición alérgica hay que tomar en consideración la posibilidad de reacciones anafilácticas en caso de existir una sensibilización a la vitamina B1. Furosemida, Antidepresivos, Digoxina, Litio, Aspirina. Los pacientes que manifiesten trastornos del sistema nervioso central no deben conducir vehículos ni usar máquinas como medida de prevención. Por contener Diclofenac, Dolo-Neurotropas Síntesis no debe ser administrado a mujeres en el periodo de gestación a menos que el médico lo considere estrictamente necesario.

Interacciones medicamentosas:

La vitamina B6 en dosificación elevada puede debilitar la acción de la L-Dopa en la enfermedad de Parkinson o el parkinsonismo sintomático. No administrar en paciente que lleve tratamiento con L-dopa, hidralazina, cicloserina, isoniazida y penicilamina, ya que la piridoxina puede actuar como antagonista de estos fármacos.

Manifestaciones y manejo de la sobredosificación o ingesta accidental:

No se han descrito casos de sobredosificación por vitamina B12 o tiamina. La neuropatía sensorial producida por la administración de dosis elevadas de vitamina B6, mejora al discontinuar la vitamina. En caso de intoxicación por diclofenac se deben aplicar medidas de apoyo y sintomáticas tales como lavado de estómago y administración de carbón activado.

Posología:

Según prescripción médica dependiendo de la severidad del caso. Mezclar el contenido de ambas ampollas en la jeringa y administrar por vía intramuscular profunda, una vez al día o cada dos días. Generalmente son suficientes de 3 a 5 inyecciones como tratamiento.

Presentación:

Caja conteniendo dos ampollas inyectables para dosis única, 1 gasa estéril como desinfectante, 1 jeringa desechable.

Conservación:

Manténgase a temperatura entre 15° y 30°C.



Elaborado en la República Dominicana por:
Laboratorios Síntesis, S.R.L.
Manos que inyectan VIDA